



### Cribado de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis.

El cáncer de pulmón es el cáncer con mayor mortalidad en España. El objetivo que se pretende con este informe es conocer la efectividad del cribado del cáncer de pulmón empleando tomografía computarizada de dosis baja de radiación (TCBD), en pacientes fumadores "importantes", para determinar su impacto en la mortalidad y estimar la fiabilidad de la prueba de cribado mediante la evaluación de la sensibilidad y especificidad. Asimismo, evaluar los efectos adversos del cribado y el potencial daño derivado de las pruebas diagnósticas asociadas a un resultado positivo.

[Texto completo](#)



### Nucleolisis discal percutánea mediante láser.

La patología discal se produce principalmente en la edad adulta y puede generar distintos grados de dolor que en algunos casos llega a ser incapacitante, repercutiendo de forma importante sobre la calidad de vida, tanto a nivel familiar como laboral. El objetivo de este informe es evaluar la seguridad y efectividad de la descompresión percutánea discal mediante láser DPDL en el tratamiento de las hernias discales lumbares, cervicales y torácicas.

[Texto completo](#)



### Efectividad y seguridad de la electroporación irreversible en los cánceres de páncreas e hígado. Revisión sistemática. Actualización.

La electroporación irreversible (IRE) es una técnica no térmica de ablación de tejidos que permite la destrucción celular por medio de una serie de pulsos eléctricos cortos y de alto voltaje. Con este informe avalia-t pretende evaluar la efectividad y seguridad de la resección tumoral mediante electroporación irreversible en el tratamiento del cáncer de páncreas y del cáncer hepático primario y metastásico, en comparación con otras técnicas ablativas y con el tratamiento estándar.

[Texto completo](#)



### Efectividad y seguridad de la LDL-Aféresis en xantomatosis cerebrotendinosa.

La xantomatosis cerebrotendinosa es una enfermedad congénita ultrarrara, que puede derivar en importantes complicaciones neurológicas graves si no se diagnostica y trata precozmente. El objetivo de este informe realizado por avalia-t es evaluar la efectividad y seguridad de la LDL-aféresis en el tratamiento de la xantomatosis cerebrotendinosa.

[Texto completo](#)